

PROTCOLE DE REEDUCATION SUTURE MENISCALE

Pas d'attelle et appui interdit 3 semaines, puis totalisation entre la 3^{ème} et la 4^{ème} semaine

- Glacer 3 à 4 fois par jour.
- Repos relatif avec modération des activités en charge pendant une semaine.
- Des délais de récupération post opératoires sont significativement prolongés en cas de lésions méniscales externes.

1. RECUPERATION PROGRESSIVE DE LA MOBILITE

Utiliser les massages défibrosants et les mouvements actifs.

La flexion : travail à débiter dès le premier jour post opératoire. Obtenir rapidement 90° puis gagner en amplitude par des mouvements actifs et actifs aidés. Les techniques de travail contre résistance des antagonistes type contracter-relâcher doivent permettre de récupérer la totalité de l'amplitude en flexion.

Interdits : La flexion forcée passive ou en charge. L'appui les 3 premières semaines.

L'extension : récupération rapide du verrouillage actif de l'articulation avec travail électif du vaste interne.

2. RECUPERATION DU SCHEMA DE MARCHE AVEC APPUI COMPLET

- À partir de la 4^{ème} semaine

3. RECUPERATION MUSCULAIRE

- Isométrique.
- Quadriceps : en travail statique intermittent, la charge appliquée sur la tubérosité tibiale antérieure, en utilisant des charges lourdes pour un travail spécifique du vaste interne.
- Ischio-jambiers : 15°, 30°, 60° de flexion, hanches fléchies.
- Triceps : en insistant sur les jumeaux.

4. REEDUCATION PROPRIOCEPTIVE

Exercices en chaîne cinétique ouverte puis fermée sur plan stable et instable : équilibre au sol, coupes, plateaux, trampoline...

5. RE-ENTRAINEMENT VERS LE DEBUT DU TROISIEME MOIS

Son but est d'accroître les difficultés de façon à améliorer les réflexes de stabilisation en se rapprochant du geste sportif.

Débuter par un footing de 10 mn, course en terrain plat puis accidenté. Accélération, changements de direction, sauts sur un pied...

La reprise de la compétition se fera en fonction du degré de récupération.

Incidents possibles

- Hydarthrose : repos, AINS, drainages et contacter l'équipe chirurgicale en cas de persistance ou de récurrence.
- Douleurs secondaires : arrêt momentané de la rééducation.

Dr Jean-Charles GRILLO



POLE ORTHO-SPORT
POLYCLINIQUE LES FLEURS

Dr Jean-Charles GRILLO



POLE ORTHO-SPORT
POLYCLINIQUE LES FLEURS